From: "5.1,2,e "
Sent: Sun, 17 Jul 2022 16:43:33 +0100
To: "5.1,2,e " <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>
Subject: wekelijkse update
Attachments: 062022 Coronaprikwijzer.pdf

Aan:
team AIZ, Hygiëne, teammanagers IZ, directie, beleid, communicatie, gezond leven, GHOR ACGZ, coördinator bellijn , omlooparts JGZ, coronapreventieteam, lab, beleid team corona; MPX coördinatoren, coördinatie BCO,
*Deze mail kan **intern** worden doorgestuurd naar collega's voor wie dit relevant is;*
Aanmeldingen/aanvullingen voor deze update graag naar @ 5.1,2,e

Beste collega's

Op verzoek, in verband met de stijgende cijfers **covid-19** en de uitbraak van **MPX,** weer een **wekelijkse update met een samenvatting/overzicht van wat er landelijk en in onze regio speelt** naar een wat bredere groep dan alleen IZ.

Nieuw tov de vorige update

Covid-19


4.1,4

4.1,4


4.1,4



4.1,4


4.1,4



4.1,4
5.1,2,e
5.1,2,e


4.1,4



4.1,4


4.1,4



4.1,4


4.1,4
5.1,2,e
4.1,4
4.1,4


4.1,4
5.1,2,e


4.1,4


4.1,4


4.1,4



MPX

Beeld landelijk/internationaal (signaleringsbericht 14-07)

- Sinds de bevestiging van de eerste patiënt met monkeypox in Nederland op 20 mei, zijn tot en met 14 juli **549 bevestigde patiënten** met monkeypox gemeld (Dat waren er op 11 juli 503.
- De meldingen komen vanuit 24 GGD regio's, waarbij **58% van de patiënten zijn gemeld door GGD Amsterdam**, 9% door GGD Haaglanden, en 6% door GGD Rotterdam-Rijnmond. Tot nu toe betreffen de meldingen voornamelijk volwassen mannen, die voor zover bekend tot de bekende risicogroep horen, en 2 vrouwen en 1 kind. Twee patiënten hadden een indicatie voor opname in een ziekenhuis.
- Het internationale beeld is verder onveranderd, de besmettingen betreffen voornamelijk volwassen mannen en <1% vrouwen en waar bekend is bij de overgrote meerderheid sprake van MSM. Wereldwijd zijn er inmiddels sinds 1 januari 2022 tot en met 13 juli 11.068 besmettingen vastgesteld, waarvan de meeste infecties zijn bevestigd in Spanje (2.447), het Verenigd Koninkrijk (1.735) en Duitsland (1.694). Bronnen: Osiris, Tweede Kamerbrief Stand van zaken apenpokken 7 juli 2022, ECDC-WHO surveillance bulletin (13 juli 2022), CDC global map

- Binnenkort wordt een vaccinatiecampagne gestart voor pre-expositievaccinatie voor hoogrisicogroepen (zie Tweede Kamerbrief), naast de reeds aangeboden post-expositievaccinatie. In eerste instantie wordt daarbij gericht op de doelgroepen MSM en transgenders die hiv-PrEP ontvangen of daarvoor op de wachtlijst staan, hiv-positief zijn en een verhoogd risico op soa hebben, of bij de CSGs (of andere behandelaar) bekend zijn in verband met een verhoogd risico op soa (inclusief MSM-sekswerkers).. Bronnen: Osiris, WHO external sitrep (6 juli 2022), ECDC-WHO surveillance bulletin (7 juli 2022), CDC global map
- _
- 8/7 heeft de minister van VWS het advies van het deskundigenberaad overgenomen en besloten om het RIVM de opdracht te geven de pre-expositievaccinatie in samenwerking met GGD'en in gang te zetten. Daarnaast is er de opdracht gegeven om onderzoek op te zetten naar onder meer het effect van Monkeypox-PrEP-vaccinatie.
- De volgende groepen die voor vaccinatie in aanmerking komen zijn **MSM en transgenders** die:
    - hiv-PrEP ontvangen of daarvoor op de wachtlijst staan via Centra voor Seksuele Gezondheid (CSG) of huisarts
    - hiv-positief zijn en een verhoogd risico op soa hebben

- bij de CSG bekend zijn met een verhoogd risico op soa, inclusief MSM sekswerkers
- niet behorend tot bovenstaande groepen, maar bij een andere behandelaar (zoals de huisarts) bekend zijn met een verhoogd risico op soa.
- Onder hoogrisicogedrag wordt verstaan: recent gewaarschuwd voor soa/hiv (via partnerwaarschuwing), symptomen van soa, eerder syfilis, gonorroe of chlamydia gehad, geen condoomgebruik bij het laatste seksuele contact of twee keer per jaar op soa getest (zie ook de multidisciplinaire PrEP-richtlijn).

Een ieder die in aanmerking komt voor PrEP-vaccinatie krijgt **twee doses met een vaccinatie-interval van vier weken**.

- Vanwege de hoge incidentie wordt er gestart in Amsterdam, te beginnen met de hivprep groep. Op dit moment wordt gekeken hoe de uitvoering vorm gaat krijgen. Communicatie met de doelgroep gaat via SoaAidsNederland en de GGD'en. Op de website van de GGD zal meer informatie komen te staan over de uitvoering.
-
- Projectteam vaccinaties GGD Amsterdam is samengesteld en is op 14/7 bij elkaar geweest:
  1. 5.1,2,e (projectleider, aanspreekpunt organisatie)
  2. 5.1,2,e / 5.1,2,e (medisch aanspreekpunt).
  3. 5.1,2,e (woordvoering)
  4. 5.1,2,e (communicatie)
  5. 5.1,2,e (vaccinbeheer, registratie)
  6. 5.1,2,e : op afroep
  7. 5.1,2,e 5.1,2,e op afroep
  8. Eindverantwoordelijk arts: wordt besproken.
  9. Medisch coördinator (uitvoering): stemt 5.1,2,e af met 5.1,2,e

Beeld MPX ASD

- **589 personen getest** (tm 16 juli)
- Het totaal aantal **positieve cases** is **368** (t/m 16 juli**); 364 MSM, 4 cases buiten deze doelgroep**
- Gestage toename in aantal positieve cases.
- Totaal aantal gevaccineerde (hoog risico)contacten) **311,** waaronder 4 kinderen
- Op CSG Adam MPX gevallen gezien waarbij sprake was van een persisterende proctitis (ontsteking van het slijmvlies van de endeldarm), terwijl de huidlaesies (indien aanwezig) al hersteld waren. Proctitis is nu toegevoegd aan de definitie voor de besmettelijke periode en aan de casusdefinitie, zie inf@ctbericht 15 en de richtlijn
- De paragraaf Algemene preventieve maatregelen van de LCI-richtlijn Monkeypox (apenpokken) is vandaag aangepast. Hieronder zijn de wijzigingen samengevat
- Hiernaast zijn er aanwijzingen dat het virus mogelijk ook via sperma overgedragen kan worden. Omdat niet bekend is hoe lang het virus in sperma uitgescheiden kan worden, wordt als voorzorgmaatregel geadviseerd om gedurende 12 weken na het verdwijnen van de huislaesies condooms te gebruiken bij seksueel contact (zowel oraal, vaginaal als anaal), conform het WHO-advies

- Twee routes voor testen ingericht (capaciteit: 26 testen per dag, 7 dagen per week: via de reguliere CSG route (MPX + soadiagnostiek) en via AIZ (uitgevoerd op een TB kamer) (MPX diagnostiek only): huisarts belt met arts AIZ via triagelijn 020-5555 337; zie informatie voor huisartsen op de ggd website;
- 8 MSM huisartspraktijken kunnen vanaf 17/7 hun patiënten, die vallen binnen de casusdefinitie, per mailtemplate aanmelden; patiënten worden vervolgens door de 5105 ingepland in de TB route
- Voor positieve indexen die een luisterend oor willen ter overbrugging van hun 3 wkn isolatieperiode , kan er een buddy worden geregeld via de Regenboog/roze buddyzorg, A.s dinsdag webinar voor buddys van de Regenboog(bron: BCO, 5.1,2,e 5.1,2,e)
- 11/7: informatiebijeenkomst in 5.1,2,e voor personeel van 5.1,2,e 5.1,2,e sauna e.a. sekslocaties

Hartelijke groet

5.1,2,e
5.1,2,e Team Algemene Infectieziekten/
Verpleegkundige
Bigregistratie: 5.1,2,e

GGD Amsterdam

T 5.1.2,e
5.1.2,e @ggd.amsterdam.nl

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
ggd.amsterdam.nl