From: "5.1,2,e "
Sent: Sun, 10 Jul 2022 17:12:09 +0100
To: "5.1,2,e " <5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl>
Subject: wekelijkse update

Aan:
team AIZ, Hygiëne, teammanagers IZ, directie, beleid, communicatie, gezond leven, GHOR ACGZ, coördinator bellijn , omlooparts JGZ, coronapreventieteam, lab, beleid team corona; MPX coördinatoren, coördinatie BCO,
*Deze mail kan **intern** worden doorgestuurd naar collega's voor wie dit relevant is;*
Aanmeldingen/aanvullingen voor deze update graag naar @ 5.1,2,e

Beste collega's

Op verzoek, in verband met de stijgende cijfers **covid-19** en de uitbraak van **MPX,** weer een **wekelijkse update met een samenvatting/overzicht van wat er landelijk en in onze regio speelt** naar een wat bredere groep dan alleen IZ.

Covid-19

4.1,4



4.1,4



4.1,4

4.1,4

5.1,2,e

4.1,4


4.1,4


4.1,4


4.1,4
50%
0%


4.1,4
5.1,2,e


4.1,4


4.1,4


4.1,4


4.1,4
5.1,2,e
4.1,4





MPX

Beeld landelijk/internationaal (cijfers 07-07, signaleringsbericht)

- Sinds de bevestiging van de eerste patiënt met monkeypox in Nederland op 20 mei, zijn er per 7 juli **402** bevestigde patiënten met monkeypox gemeld. Dat waren er vorige week nog 288.
- De meldingen komen vanuit 23 GGD regio's (vorige week 22), waarbij **60% van de cases zijn gemeld door GGD Amsterdam**, 9% door GGD Haaglanden, en 5% door GGD Rotterdam-Rijnmond. In Nederland is voor het eerst bij een vrouw monkeypox vastgesteld via bron- en contactopsporing.

- Het internationale beeld is verder onveranderd, de besmettingen betreffen vrijwel allen MSM. De WHO heeft besproken of de huidige monkeypoxuitbraak een Public Health Emergency of International Concern is, maar hiertoe niet besloten omdat transmissie voornamelijk in Europa plaatsvindt (bijna 90% van alle gevallen).
- Wereldwijd zijn er inmiddels tot en met 6 juli 7243 besmettingen vastgesteld, waarvan de meeste infecties zijn bevestigd in het Verenigd Koninkrijk (1351), Duitsland (1304) en Spanje (1256). Bronnen: Osiris, WHO external sitrep (6 juli 2022), ECDC-WHO surveillance bulletin (7 juli 2022), CDC global map
-
- Afgelopen vrijdag heeft de minister van VWS het advies van het deskundigenberaad overgenomen en besloten om het RIVM de opdracht te geven de pre-expositievaccinatie in samenwerking met GGD'en in gang te zetten. Daarnaast is er de opdracht gegeven om onderzoek op te zetten naar onder meer het effect van Monkeypox-PrEP-vaccinatie.
- De volgende groepen die voor vaccinatie in aanmerking komen zijn **MSM en transgenders** die:
    - hiv-PrEP ontvangen of daarvoor op de wachtlijst staan via Centra voor Seksuele Gezondheid (CSG) of huisarts
    - hiv-positief zijn en een verhoogd risico op soa hebben
    - bij de CSG bekend zijn met een verhoogd risico op soa, inclusief MSM sekswerkers
    - niet behorend tot bovenstaande groepen, maar bij een andere behandelaar (zoals de huisarts) bekend zijn met een verhoogd risico op soa.
    - Onder hoogrisicogedrag wordt verstaan: recent gewaarschuwd voor soa/hiv (via partnerwaarschuwing), symptomen van soa, eerder syfilis, gonorroe of chlamydia gehad, geen condoomgebruik bij het laatste seksuele contact of twee keer per jaar op soa getest (zie ook de multidisciplinaire PrEP-richtlijn).

  Een ieder die in aanmerking komt voor PrEP-vaccinatie krijgt **twee doses met een vaccinatie-interval van vier weken**.

  Vanwege de hoge incidentie wordt er gestart in Amsterdam, te beginnen met de hivprep groep. Op dit moment wordt gekeken hoe de uitvoering vorm gaat krijgen. Communicatie met de doelgroep gaat via SoaAidsNederland en de GGD'en. Op de website van de GGD zal meer informatie komen te staan over de uitvoering.

Beeld MPX ASD

- **479 personen getest** (tm 10 juli)
- Het totaal aantal **positieve cases** is **300** (t/m 10 juli**); 298 MSM, 2 cases buiten deze doelgroep**
- Gestage toename in aantal positieve cases.
- Totaal aantal gevaccineerde (hoog risico)contacten) **212,** waaronder 4 kinderen
- Op CSG Adam MPX gevallen gezien waarbij sprake was van een persisterende proctitis (ontsteking van het slijmvlies van de endeldarm), terwijl de huidlaesies (indien aanwezig) al hersteld waren. Proctitis is nu toegevoegd aan de definitie voor de besmettelijke periode en aan de casusdefinitie, zie inf@ctbericht 15 en de richtlijn
- De paragraaf Algemene preventieve maatregelen van de LCI-richtlijn Monkeypox (apenpokken) is vandaag aangepast. Hieronder zijn de wijzigingen samengevat
- Hiernaast zijn er aanwijzingen dat het virus mogelijk ook via sperma overgedragen kan worden. Omdat niet bekend is hoe lang het virus in sperma uitgescheiden kan worden, wordt als voorzorgmaatregel geadviseerd om gedurende 12 weken na het verdwijnen van de huislaesies condooms te gebruiken bij seksueel contact (zowel oraal, vaginaal als anaal), conform het WHO-advies

- Twee routes voor testen ingericht (capaciteit: 26 testen per dag, 7 dagen per week: via de reguliere CSG route (MPX + soadiagnostiek) en via AIZ (uitgevoerd op een TB kamer) (MPX diagnostiek only): huisarts belt met arts AIZ via triagelijn 020-5555 337; zie informatie voor huisartsen op de ggd website;
- Voor positieve indexen die een luisterend oor willen ter overbrugging van hun 3 wkn isolatieperiode , kan er een buddy worden geregeld via de Regenboog/roze buddyzorg, gesprekken met Regenboog hierover zijn nog gaande voor dat dit van start kan gaan (bron: BCO, 5.1,2,e)
- A.s maandag 11 juli 19:30 -20:30 webinar van SOA AIDS Nederland voor GGD'en en huisartsen; 5.1,2,e dermatoloog van ons CSG geeft een presentatie

Hartelijke groet

5.1,2,e

5.1,2,e Team Algemene Infectieziekten/

Verpleegkundige
Bigregistratie: 5.1,2,e

GGD Amsterdam

T 5.1,2,e
5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
ggd.amsterdam.nl